Errata des Buchs: Inf-Sup Stable Space-Time Methods for Time-Dependent Partial Differential Equations

Marco Zank

23. Oktober 2020

- S. 79, Z. 14: Thus, for $f \in [H^{1/2}_{,0}(0,T)]'$, the usual notation
- S. 112, Z. 13:
$$\left\| u_h - Q^{1/2}_{h_t} Q^1_{h_x} u \right\|^2_{H^{1/2}_{0,}(0,T;L^2(\Omega)),F} \leq \dots$$
- S. 123, Z. 13:
$$\int_0^T \langle u(\cdot,t), v \rangle_{L^2(\Omega)} \frac{\mathrm{d}^2 \varphi}{\mathrm{d}t^2}(t) \mathrm{d}t + \dots$$
- S. 124, Z. 21:
$$\frac{1}{h^2_{t,\ell}} \left\langle U_{h_x,\ell} - U_{h_x,\ell-1} - h_{t,\ell} \hat{U}_{h_x,\ell-1}, v_{h_x} \right\rangle_{L^2(\Omega)} + \frac{1}{4} \langle \nabla_x U_{h_x,\ell} + \nabla_x U_{h_x,\ell-1}, \nabla_x v_{h_x} \rangle_{L^2(\Omega)} = \frac{1}{4} \langle f(\cdot,t_\ell) + f(\cdot,t_{\ell-1}), v_{h_x} \rangle_{L^2(\Omega)}$$